

pied-mère les feuilles sont tombées depuis trois semaines, le broussin est encore entièrement feuillé. On peut le voir à l'extrémité Est des anciennes galeries d'anatomie comparée, du côté gauche et tout près du bâtiment, dans un petit jardin actuellement occupé par le service des allées.

Jusqu'à présent, les fleurs de ce broussin n'ont pas fructifié.

Le sureau commun a déjà donné une monstruosité d'une autre nature, fixée par le bouturage et qui consiste dans la fasciation des rameaux; cette forme est connue des horticulteurs sous le nom de *Sambucus nigra monstrosa*.

LISTE DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES QUI ONT FLEURI  
DANS LES SERRES DU MUSÉUM DU 20 JUIN AU 20 NOVEMBRE 1901,

PAR M. D. BOIS.

|                                                         |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACRIDOCARPUS SMEATHMANI Guill. et Perrot.               | COLQUHOUNIA COCCINEA Wall.                                                                                               |
| ÆGIPHILA MARTINICENSIS Jacq.                            | CORDIA GLABRA Cham.                                                                                                      |
| ALMEIDEA MACROPETALA Fisch. et Mey.                     | COSTUS CYLINDRICUS Rosc.                                                                                                 |
| ANOMUM SCEPTUM Oliv. et Hanb.                           | — sp. (Gabon.)                                                                                                           |
| AMPHITECNA NIGRIPES Baill.                              | CUSPARIA MACROPHYLLA Engl.                                                                                               |
| ANGRECEM DISTICHUM Lindl.                               | DESMODIUM INCANUM D C.                                                                                                   |
| ANOMOSANTHES ZANZIBARICUS H. P.                         | DIOCLEA GLYCINOIDES Hort.                                                                                                |
| APHELANDRA CRISTATA A. Br.                              | DIOSPYROS EMBRYOPTERIS Pers.                                                                                             |
| BAUHINIA RACEMOSA Vahl.                                 | DISCHIDIA BENGALENSIS Coleb. (Plante dont nous avons, pour la première fois, observé la floraison au Muséum.)            |
| BOWKERIA TRIPHYLLA Harv.                                | DISSOTIS PROSTRATA Hook.                                                                                                 |
| BULBINE ALOIDES Willd.                                  | DUNALIA CYANEA Rouv.                                                                                                     |
| BULBOPHYLLUM CUPREUM Lindl.                             | DUPARQUETIA ORCHIDACEA H. Bn. (Légumineuse ornementale dont les graines ont été envoyées du Congo, par le R. P. Klaine.) |
| CALLICARPA AMERICANA L.                                 | EPHEDRA ALTISSIMA Desf.                                                                                                  |
| CALLIPHURIA HARTWEGIANA Herb.                           | EPIDENDRUM CLAVATUM Lindl.                                                                                               |
| CELASTRUS BUXIFOLIUS L.                                 | — POLYBILEON Sw.                                                                                                         |
| CEPHELIS BEERI Teijsm. et Binn.                         | ERIA CONVALLARIOIDES Lindl.                                                                                              |
| CEREUS GRANDIFLORUS Mill.                               | ERYTHROCHITON BRASILIENSE Nees et Mart. (A donné des fruits qui sont parvenus à maturité.)                               |
| — MACDONALDIE Hook.                                     | EULOPHIA PULCHRA Rolfe.                                                                                                  |
| — NYCTICALUS Link.                                      | EUPHORBIA LOPHOGONA Lamk.                                                                                                |
| — TRIANGULARIS Mill.                                    | FREYLINIA CESTROIDES Colla.                                                                                              |
| CESTREUM LAURIFOLIUM L'Hérit.                           | GALIPEA RIEDELIANA Regel.                                                                                                |
| CHAVICA OFFICINARUM Lindl. (Poivre long des officines.) | GENDARUSSA VENTRICOSA Nees.                                                                                              |
| CIPADESSA FRUTICOSA Blume.                              | GLOBBA SCHOMBURGHII Hook. f.                                                                                             |
| CLERODENDRON CALAMITOSUM L.                             | GOMPHIA DECORANS Lem.                                                                                                    |
| — FALLAX Lindl.                                         |                                                                                                                          |
| — MACROPHYLLUM Bl.                                      |                                                                                                                          |
| CLEYERA JAPONICA Sieb. et Zucc.                         |                                                                                                                          |
| CLAVIJA ORNATA D. Don.                                  |                                                                                                                          |
| COLLETTIA CRUCIATA Gill. et Hook.                       |                                                                                                                          |

GONGORA GALEATA Reichb.  
 HELICTERES ISORA L.  
 HIBISCUS CALIFORNICUS Kellog.  
 IXORA AGUMINATA Roxb.  
 — COCCINEA L.  
 — ODORATA Hook.  
 — UNDULATA Roxb.  
 JAMBOSA CAULIFLORA DC.  
 — KORTHALSI Blume. (A donné des fruits qui ont mûri.)  
 JATROPHA PODAGRICA Hook.  
 JUANULLOA AURANTIACA Otto et Dietr.  
 LEPTACTINIA MANNI Hook. (Arbre aux étoiles, du Congo.)  
 LIMONIA SPECTABILIS Miq.  
 MACARANGA PORTEANA Ed. André.  
 MACLEANIA INSIGNIS Mart.  
 MACROSTIGMA TUPISTROIDES Kunth.  
 MALPIGHIA PUNICIFOLIA L. (Crisier des Antilles.)  
 MARANTA ARUNDINACEA L. (Arrow-root.)  
 — LEPTOSTACHYA Regel et Kœrn.  
 MARLEA BEGONIFOLIA Roxb.  
 MEDINILLA CURTISH Hort.  
 — VENOSA Blume.  
 MIMOSA LINDBHEIMERI A. Gray.  
 MOGIPHANES JACQUINI Schrad.  
 MUSA ROSACEA Jacq.  
 MYRISTICA CORTICOSA Bedd.  
 OPUNTIA COCHINELIFERA Mill. (Vrai.) Les plantes généralement cultivées sous ce nom appartiennent à d'autres espèces. Nous devons cette plante à M. Robert Rolland Gosselin. La détermination a été contrôlée par M. le Dr Weber.  
 OTHONNA CARNOSA Less.  
 OXALIS ORTGIESII Regel.  
 — VESPERTILIONIS Zucc.  
 PACHIRA ALBA Walp. (A produit 3 fruits qui sont parvenus à maturité.)  
 PAULLINIA PINNATA L.  
 PELLIONIA PULCHRA N. E. Br.  
 PETREA VOLUBILIS L. (Belle plante grimpante aux longues grappes de fleurs violettes.)  
 PILOGEREUS HOULLETIANUS Leml.

PIPER BETLE L. (C'est le Bétel, employé comme masticatoire avec la noix d'Arc.)  
 — FITOKADSURA Sieb.  
 QUASSIA AMARA L. (On n'observe la floraison de cette plante que sur des exemplaires déjà âgés; c'est le véritable Quassia amara.)  
 RHIPSALIS FOVEOLATA WEB. (Espèce nouvelle.)  
 RHUS MUCRONATA Thunb.  
 RHYNCHOSIA CYANOSPERMA Benth. (Légumineuse aux jolies graines bleues; fructifie dans nos serres.)  
 RISSELIA JUNCSEA ZUCC. (Très élégant arbuste aux fleurs rouge vif.)  
 SARCOCOCCA PRUNIFORMIS Lindl.  
 SERJANIA TRIQUETRA Radlk.  
 SHAWIA PANICULATA Forst. (Curieuse Composée arborescente.)  
 SMILAX MAURITANICA Poir.  
 SOLANUM WORSLEYANUM. (Espèce nouvelle à fruits comestibles. A fleuri et fructifié au Muséum.)  
 SOPHORA VIOLACEA Thw.  
 SPATHODEA CAMPANULATA Beauv. (Tulipier du Gabon.)  
 SPATHOPHYLLUM PATINI N. E. Br.  
 SPHEROSTEMA PROPINQUUM Blume.  
 STEMONA TUBEROSA Lour.  
 STEUDNERA COLOCASLEFOLIA K. Koch.  
 STROMANTHE SANGUINEA Sond.  
 SYNAPTOLEPIS KIRKII Oliv.  
 TABERNEMONTANA CITRIFOLIA L. (Sert à coaguler le caoutchouc.)  
 TALISIA PRIEURIANA H. P.  
 THEOPHRASTA JUSSIEI Hook.  
 THUNBERGIA ERECTA T. Anders.  
 TORENIA FLAVA Buch. Ham.  
 TREVESIA SUNDAICA Miq. (Plante très rare, de la famille des Araliacées, à feuillage très particulier; a fructifié.)  
 TRICHOCLADUS CRINITES Pers.  
 TRICHOPILIA TORTILIS Lindl.  
 TURNERA ELEGANS Otto.  
 VERBESINA SERRATA Cav.  
 ZAMIA FURFURACEA Ait.

UNE VISITE AUX ÉTABLISSEMENTS  
DE BOTANIQUE COLONIALE ET D'AGRICULTURE TROPICALE DE BERLIN,  
PAR AUG. CHEVALIER, DOCTEUR ÈS SCIENCES.

J'ai fait, du 5 au 17 novembre 1901, un voyage en Allemagne et en Belgique en vue de préparer la mission que je compte accomplir prochainement en Afrique centrale. Sur les conseils de mon maître M. Edmond Perrier, directeur du Muséum d'histoire naturelle, j'ai profité aussi de ce voyage pour étudier le fonctionnement colonial de quelques établissements scientifiques consacrés à la botanique et à l'agriculture tropicale. Grâce à sa recommandation, j'ai reçu partout un accueil extrêmement bienveillant; non seulement on m'a ouvert libéralement les collections que j'avais besoin de visiter, mais les savants éminents qui sont à la tête de ces différents établissements m'ont donné d'amples détails sur leur fonctionnement et leur organisation. Qu'ils me permettent de leur exprimer, dans cette note, mes remerciements les plus sincères.

Les principales collections et les principaux musées visités sont les suivants :

1. COLLECTION GEORG SCHWEINFURTH.

Le but principal de mon voyage était de venir chercher, pour ma prochaine mission, les conseils de l'un des plus grands explorateurs africains. Le voyage de Georg Schweinfurth au centre de l'Afrique<sup>(1)</sup>, de 1868 à 1871 est trop connu en France pour que je refasse son histoire. « Comme explorateur africain, écrivait déjà en 1875 un Anglais, Winwood Reade, il s'est placé au premier rang parmi les Mungo-Park, les Denham, les Clapperton, les Liwinstone, les Burton, les Barth, les Rohlfs. » Depuis ce voyage aux sources du Bahr-El-Ghazel, son bagage géographique s'est considérablement accru, puisqu'il a accompli tant dans le Nord de l'Afrique que dans l'Arabie, 40.000 kilomètres d'itinéraires.

Quoiqu'il n'occupe aucune situation officielle à Berlin, M. Schweinfurth est pour tous les jeunes explorateurs un maître dont la bonté et la science sont inépuisables. Son cabinet est un véritable trésor où des centaines de dossiers sont rassemblés sur toutes les questions concernant spécialement l'histoire naturelle et l'ethnographie de l'Afrique. Son herbier est la plus importante collection botanique africaine et les deux tiers des matériaux qu'il renferme ont été récoltés par M. Schweinfurth lui-même. Il a apporté un soin tout spécial à la préparation des plantes difficiles à mettre en herbier,

(1) G. SCHWEINFURTH (trad. LOREAU), *Au cœur de l'Afrique*, 2 vol., 1875, Hachette, éditeur.